

ТЕСТ НА ОРИЕНТАЦИЮ И АМНЕЗИЮ ГАЛВЕСТОНА The Galveston Orientation and Amnesia Test (GOAT)

Тест на ориентацию и амнезию Галвестона используют для определения конца периода посттравматической амнезии. Тест содержит ряд вопросов, которые оценивают временную и пространственную ориентацию, биографические знания, память. Тестирование проводят ежедневно. По мере восстановления памяти оценка растет.

Вопрос	Балл ошибки	Примечания
Как ваше имя?	-2	Должен назвать имя и фамилию
Когда вы родились?	-4	Должен назвать день, месяц, год
Где вы живете?	-4	Должен назвать город
Где вы находитесь сейчас? А) город Б) госпиталь / больница	-5	Должен назвать правильно город Достаточно сказать слово «больница», без указания ее точного названия
Когда вы поступили в больницу?	-5	Назвать дату
Как вы добирались до больницы?	-5	Назвать вид транспорта
Какое первое событие, случившееся вслед за травмой, вы можете вспомнить?	-5	Достаточно назвать любое событие, имевшее место
Можете ли вы вспомнить последнее, что происходило перед травмой?	-5	Достаточно назвать любое событие, имевшее место
Можете ли вы описать детали?	-5	Должен описать детали события
Сколько сейчас времени?	-5	-1 балл за каждую ошибку в полчаса
Какой сегодня день недели?	-3	-1 балл за каждый ошибочно названный день
Какое сегодня число?	-5	-1 балл за каждое ошибочно названное число
Какой сейчас месяц?	-15	-5 баллов за каждый ошибочно названный месяц
Какой сейчас год?	-30	-10 баллов за каждый ошибочно названный год

Общая ошибка =

Итоговый балл = 100 – общая ошибка = 100 – =

Тестирование проводится ежедневно. Больному задают ряд вопросов, при всех правильных ответах итоговый балл равен 100. Если на какие-либо вопросы больной не отвечает либо дает ошибочный ответ, то из 100 вычитают так называемый балл ошибки (максимально возможный балл ошибки указан напротив каждого вопроса). Таким образом, чем меньше итоговый балл, тем более выражена амнезия и дезориентация пациента. По мере восстановления памяти оценка растёт. Балл, равный 78 и более, полученный 3 раза подряд, свидетельствует об окончании периода посттравматической амнезии.

Тест не может быть использован в тех случаях, когда посттравматическая амнезия сохраняется долгие месяцы после травмы.